



DOLVEN[®] Suspension buvable pédiatrique

Ibuprofène 20 mg/ml

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice car elle contient des informations importantes pour vous

Ce médicament peut être obtenu sans prescription médicale. Vous devez néanmoins utiliser Dolven suspension pédiatrique avec le plus grand soin pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
- Si vous avez besoin d'informations ou de conseils, consultez votre pharmacien
- Consultez votre médecin si les symptômes s'aggravent ou ne s'améliorent pas au bout de quelques jours

1/IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Ibuprofène 2 g

Excipients : saccharose, sorbitol cristallisable, glycérol, avicel RC591, polysorbate 80, parahydroxybenzoate de méthyle, rouge cochenille, arôme fraise, eau purifiée q.s.p. 100 ml

Forme pharmaceutique

Suspension buvable pédiatrique, flacon de 120 ml

Classe thérapeutique

ANALGESIQUE ET ANTIPYRETIQUE

2/ DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques :

Il est indiqué chez le nourrisson et l'enfant de 6 mois à 15 ans dans :

- Traitement de la fièvre et/ou des douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures

3/ ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications :

Votre enfant ne doit pas prendre Dolven suspension buvable, si :

- Il est allergique au composant actif Ibuprofène ou à l'un des autres composants du médicament
- Il a manifesté dans le passé une crise d'asthme, un gonflement des muqueuses nasales ou une réaction de la peau après la prise d'acide acétylsalicylique (aspirine) ou d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens
- Il présente des antécédents d'ulcère gastro-intestinal ou de saignements gastro-intestinaux
- Il souffre d'une insuffisance rénale ou hépatique grave ou de troubles cardiaques graves
- C'est un nourrisson de moins de 6 mois
- Il souffre de lupus érythémateux disséminé (maladie du système immunitaire)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Prudence lors d'antécédents d'insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque ou d'ulcère gastro-duodéal
- Si votre enfant est atteint de la varicelle, Dolven ne doit pas être utilisé que sur avis médical car il peut augmenter le risque d'infections.

Les patients qui prennent en même temps d'autres médicaments contre la douleur ou la fièvre ou des antibiotiques, ne

doivent prendre Dolven que conformément aux instructions du médecin traitant

- Si vous utilisez Dolven pour des maux de ventre qu'après avoir consulté un médecin

- Si votre enfant souffre d'une maladie grave et/ou prend régulièrement des médicaments, vous devez consulter le médecin traitant avant d'utiliser Dolven

- En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte de la teneur en saccharose

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Informez votre médecin ou votre pharmacien si votre enfant utilise ou a utilisé récemment d'autres médicaments, même s'il s'agit de médicaments disponibles sans ordonnance

Notamment : les glucocorticoïdes, autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens / Analgésiques (risque augmenté d'ulcère gastro-intestinal et de saignements gastro-intestinaux)

Autres : lithium, anticoagulants, méthotrexate, certains diurétiques et antihypertenseurs, Zidovudine

Dolven n'est pas destiné aux adultes. Dans le cas où ce médicament serait tout de même utilisé par des adultes, il leur est déconseillé de l'utiliser en même temps que l'alcool

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

Dolven n'est pas destiné à des adultes, si des femmes enceintes l'utilisent tout de même, le médecin traitant doit en être averti.

Pendant le premier et le deuxième trimestre de la grossesse, Dolven ne doit être utilisé qu'après consultation d'un médecin.

Il est contre-indiqué pendant les trois derniers mois de grossesse.





Allaitement

Il convient par mesure de précaution d'éviter de l'administrer chez la femme qui allaite
D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINE

Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges et de troubles de la vue

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose, PHBM, Colorant E124 et sorbitol

4/ COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

La posologie usuelle est de 20 à 30 mg/kg/jour en 3 prises sans dépasser 30 mg/kg/jour

Le délai entre deux administrations est de 8 heures

Mode et Voie d'administration

Voie orale

Bien agiter le flacon avant emploi

Dolven peut être pris avec ou sans aliments. Pour les patients ayant un estomac sensible, il est recommandé de prendre

Dolven au cours d'un repas.

Ce médicament s'administre au moyen de la seringue doseuse pour administration orale fournie (graduée en kg de poids corporel) qui délivre une dose de 10 mg/kg par prise

Mode d'emploi de la seringue doseuse

La dose à administrer pour une prise est obtenue en remplissant la seringue doseuse jusqu'à la graduation correspondante au poids de l'enfant.

Durée du traitement

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un autre trouble, en informer votre médecin

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas de surdosage, contacter d'urgence votre médecin ou votre pharmacien. Les premiers signes d'un surdosage sont : maux de tête, étourdissement, somnolence et perte de connaissance.

Les symptômes suivants peuvent aussi se manifester lors d'un surdosage : vomissement, nausées et maux de ventre.

Conduite à tenir au cas ou l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Ne donnez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de donner.

5/ EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

Comme tous les médicaments, Dolven peut entrainer des effets indésirables :

- Effets gastro-intestinaux : sensation de brûlure, maux de ventre, nausées, vomissements, troubles du transit. Très rarement ulcère gastro-intestinal accompagné parfois de saignement ou d'une perforation. Ces troubles sont d'autant plus fréquents que la posologie utilisée est élevée et la durée de traitement prolongée

- Réactions d'hypersensibilité : urticaire, démangeaison, crise d'asthme, gonflement du visage. Si un de ces symptômes se manifeste ce qui peut se produire dès la première utilisation, il faut consulter immédiatement un médecin

- Effets cutanés : très exceptionnellement éruption bulleuse

- Effets sur le système nerveux central : exceptionnellement vertiges et céphalées

Si vous remarquez un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice ou que vous considérez comme grave, informez en votre médecin ou votre pharmacien

Les effets indésirables peuvent être évités par la prise de la plus petite dose efficace le moins longtemps possible

Des maux de tête peuvent apparaître lors de l'utilisation prolongée de fortes doses d'anti-douleurs en général mais surtout d'association de différents anti-douleurs

6/ CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

Ne pas laisser ni à la portée ni à la vue des enfants

7/ PRESENTATION

AMM N° : 925 321 1

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres,
- un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à portée des mains des enfants

FAP007/04



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

